



UBND XÃ LA NGÀ
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
TỔNG HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

La Ngà, ngày 20 tháng 10 năm 2026

BÀI TUYÊN TRUYỀN
CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG MÙA MƯA NĂM 2026 TRÊN ĐỊA
BÀN XÃ LA NGÀ.

(Kèm theo Văn bản số 85 /TTDVTH ngày 20 / 10 /2026 của Trung tâm dịch vụ tổng hợp La Ngà)

Kính thưa bà con nuôi trồng thủy sản.

Theo kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước cấp cho nuôi trồng thủy sản tại các khu vực hồ Trị An (các xã Trị An, Định Quán, La Ngà), của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, chất lượng nước khu vực hồ Trị An và sông La Ngà nhìn chung vẫn đảm bảo cho hoạt động nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, tại một số thời điểm đã ghi nhận hiện tượng gia tăng chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng và sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh như *Aeromonas*, *Streptococcus agalactiae* cùng với sự hiện diện của tảo lam trong nguồn nước. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cá nuôi khi điều kiện môi trường biến động bất lợi.

Diễn biến, xu hướng thời tiết.

Theo dự báo khí tượng thủy văn, tháng 9 và tháng 10 là thời kỳ cao điểm mùa mưa tại khu vực Đông Nam Bộ, lượng mưa có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về sẽ làm thay đổi các chỉ tiêu môi trường nước như độ đục, pH, oxy hòa tan và chất hữu cơ trong thủy vực. Đây là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát triển, làm cá dễ bị stress, giảm sức đề kháng và tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Khuyến cáo đối với bà con nuôi cá lồng bè.

1. Chủ động các giải pháp chăm sóc hợp lý để đảm bảo sức khỏe vật nuôi, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, có biện pháp bảo vệ an toàn đối với thủy sản nuôi, tiến hành thu hoạch thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm...

2. Tăng cường oxy cho cá.

Trong mùa mưa, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm, lượng oxy hòa tan thường giảm mạnh. Bà con cần chủ động sử dụng máy sục khí, quạt nước hoặc các thiết bị tạo oxy nhằm đảm bảo nguồn oxy đầy đủ cho cá nuôi. Đây là biện pháp rất quan trọng giúp giảm hiện tượng cá nổi đầu và hạn chế thiệt hại do thiếu oxy.

3. Quản lý thức ăn hợp lý.

Chỉ cho cá ăn vừa đủ theo nhu cầu thực tế, không cho ăn quá nhiều gây dư thừa thức ăn trong lồng bè. Thức ăn thừa phân hủy sẽ làm tăng COD, tạo điều kiện cho vi khuẩn và tảo phát triển. Khi thời tiết mưa kéo dài hoặc cá có biểu hiện giảm ăn, cần giảm lượng thức ăn phù hợp.

4. Tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học.

Định kỳ sử dụng chế phẩm vi sinh giúp phân hủy chất hữu cơ, giảm lượng bùn cặn, hấp thụ các nguồn dinh dưỡng dư thừa trong nước. Việc sử dụng chế phẩm sinh học không những cải thiện chất lượng nước mà còn góp phần hạn chế sự phát triển của tảo và vi khuẩn gây bệnh.

5. Chủ động phòng bệnh cho cá.

Bà con cần thường xuyên vệ sinh lồng bè, loại bỏ rong rêu và các vật bám trên lưới để tăng khả năng lưu thông nước. Sử dụng vôi bột, thuốc tím KMnO_4 ... đựng trong bao tải treo ở đầu nguồn nước hoặc khu vực cho ăn trong các lồng bè để khử trùng môi trường nước và diệt các tác nhân gây bệnh cho cá nuôi. Đồng thời bổ sung vitamin C, khoáng chất và men tiêu hóa vào thức ăn để nâng cao sức đề kháng cho cá.

Thông điệp gửi đến bà con.

"Theo dõi môi trường thường xuyên - Quản lý thức ăn hợp lý - Tăng cường phòng bệnh chủ động - Bảo vệ môi trường nuôi là chìa khóa để nuôi cá an toàn, hiệu quả và bền vững trên hồ Trị An và sông La Ngà."